

stimmt und findet sich auch in Halbherr's Fauna des Val Lagarina als solche aufgeführt. *Ph. Gobanzi* ist aus Flitsch (Krain) beschrieben.

(Dr. J. Daniel.)

15. *Luperus nigripes maritimus* m. ab. nov.: Halsschild, Kniee, manchmal auch die ganzen Vorderschienen und die ersten 3 Fühlerglieder rötlichgelb bis rotbraun. Einzeln unter dem in den ligurischen und Seealpen als Lokalrasse vorkommenden *nigripes geniculatus*. (Dr. J. Daniel.)

Beiträge zur Koleopteren-Geographie.

Originalmitteilungen

von Custos L. Ganglbauer (Wien), Ste-Claire Deville (Nice), K. Holdhaus (Wien), J. Breit (Wien), J. Daniel (Ingolstadt), K. Daniel (München).

Custos L. Ganglbauer, Wien:

Von einer mehrtägigen Sammelexcursion auf die Cerna-prst in der Wochein (Krain), die ich mit meinem Freunde Rudolf Pinker Ende Juni 1902 unternommen hatte, seien folgende bemerkenswertere Arten erwähnt:

Trechus (Anophthalmus) bohiniensis m. n. sp. in einiger Anzahl — *Laemostenus Schreibersi* Küst., *Lathrobium (Glyptomerus) cavicola* Müll. und *Trogloorhynchus anophthalmus* Schmidt in einzelnen Stücken auf Geröllhalden der alpinen Region unter tief in den Boden gebetteten Steinen. Ebenda auch *Stomis rostratus* Sturm. — Auf denselben Geröllhalden auf Steinen herumkriechend einige *Orobites nigrinus* Rtrr. (aus Bosnien beschrieben), einzelne *Styphlus alpinus* Pen. (*Trachysoma alpinum* Pen.) und *Lepyryus variegatus* Schmidt (*Ganglbaueri* Fst.). — Auf Almboden unter Steinen *Otiorrhynchus subpubescens* Strl. — Auf Krummholz recht zahlreich *Otiorrhynchus consentaneus* Boh. — An einem Schneefelde unter einem sehr nass gelegenen Steine *Arpedium macrocephalum* Epp. — Auf *Senecio*: *Alophus austriacus* Otto in prachtvollen Stücken. — Auf *Chaerophyllum*: *Oreina bifrons* Stussineri Weise. — Auf *Petasites niveus*: *Oreina liturata* Scop. — Auf *Doronicum austriacum*: *Oreina plagiata commutata* Suffr.

Ste-Claire Deville, Nice:

Nebria morula Dan.: L'Authion, forêt de Turini, alp. marit. — Madonna della Finestra, alp. marit.

Notiophilus pusillus Waterh., Spaeth (*bigeninus* Thoms.): Gudmont, Haute-Marne, août 1902.

Bembidium fasciolatum-Stammform: Nice, bords du Paillon, bords du Var, Clans, bords de la Tinée. — Savoie, Hauteluze (coll. Puel, Béziers).

- Bembidium fasciol. ascendens* Dan.: St Martin-Vésubie, bords du Borréon.
— Isère; Entre-deux-guiers (V. Planet).
- Bembidium coeruleum* Serv.: Nice, bords du Paillon. — Var: Cuers. —
Avignon (Dr. Chobaut).
- Bembidium coerul. Bugnioni* Dan.: Avignon (Dr. Chobaut).
- Bembidium tibiale* Dft.: St Martin-Vésubie. — Aude, environs de Belcaire
(coll. Puel, Béziers).
- Bembidium Redtenbacheri* Dan.: Mont Dore en Auvergne (coll. Puel,
Béziers) — Isère, les Echelles (massif de la Grande-Charthreuse)
(V. Planet) — St Martin-Vésubie.
- Bembidium complanatum* Heer: St Martin-Vésubie.
- Bembidium longipes* Dan.: St Martin-Vésubie, bords du Borréon.
- Bembidium atrocoeruleum* Steph.: Aude, environs de Belcaire (coll. Puel,
Béziers).
- Amara lantoscana* Fauvel: M^t Scandaïl, alp. marit. 1902.
- Polydrosus (Chlorodrosus) Abeillei* Desbr.: Courmes, alp. marit. 1902.

K. Holdhaus, Wien:

- Vom Monte Pavione in den cadorischen Dolomiten (1902, Holdhaus): *Plectes Creutzeri Kircheri* Germ. hfg. — *Orinocarabus alpestris Bertolinii* Kr., *Linnei* Panz. — *Trechus pallidulus* Gglbr. nicht selten, *Breiti* Gglbr., 4 Stück unter tief liegenden Steinen unterhalb des Gipfels. — *Abax parallelopedus* Dej., *Beckenhaupti-Echeli* Bert. — *Pterostichus baldensis* Palae Müll. — *Tapinopterus placidus* Rosh., 3 Stücke unterhalb des Gipfels. — *Brososoma baldense* Rsh., selten. — *Amara pasubiana* Dan. (nicht *dolomitana* Dan.!) in Anzahl. — *Absidia Birnbacheri* Krauss, in geringer Anzahl, auch 1 ♀, die Stücke sind, wie jene vom Rolle-Pass, ganz schwarz. — *Otiorrhynchus tridentinus* Dan. nicht selten. *Orinocarabus concolor Redtenbacheri* Géh.: In der Rauris (Otto) und auf dem Hoch-Obir (Klimsch).
- Orinocarabus alpestris Hoppei* Germ.: 1 Stück von den Gailtaler Alpen (Gugg-Alm in der Sifflitz), das eine Mittelstellung zwischen *alpestris*-Stammform und *Hoppei* einnimmt (Holdhaus).
- Orinocarabus Linnei* Panz.: Gailtaler Alpen (Sifflitz) 1 Stück (Holdhaus).
- Cychnus angustatus* Hoppe: Dobratsch (Berger).
- Cychnus Schmidti* Chaud.: Wolaya-See in den karnischen Alpen (Holdhaus).
- Asmerinx Knauthi* Gglbr.: Dobratsch, 1 Stück (Holdhaus).
- Reichenbachia Klimschi* Holdh.: Admont (Steiermark), 3 ♂♂ (Hauptmann Zellich) (Holdhaus det.).
- Bythinus Halbherri* Rtrr.: Campo grosso (Piano della Fugazza, Südtirol), 1 ♂ oberhalb der Finanz-Kaserne unter einem tief in grasreichen Boden eingebetteten Stein (25. 7. 1902, Holdhaus), 1 ♀ ebenda (Ganglbauer, Holdhaus det.).
- Hypocyptus Pirazzolii* Baudi: Am Ufer des Loibl-Baches bei Ferlach in Kärnten (17. 8. 1902, Holdhaus leg. et det.) unter Steinen, welche auf nicht allzu feuchtem Letten aufliegen, schwärmt abends, 2 Exemplare.
- Pteroloma Forströmi* Gyll.: Bei Metnitz in Kärnten (Klimsch).